

## Odporúčané použitie vakcín proti myxomatóze a moru králikov podľa epizootologickej situácie

NÁKAZOVÁ SITUÁCIA		VAKCÍNA	VEK VAKCINÁCIE V TÝŽDŇOCH
MXT *	MOR		
dobrá	dobrá	PESTORIN MORMYX inj. (jeden vpich) <b>alebo</b> MYXOREN inj. + PESTORIN NEO inj. (oddelene na dve miesta)	10.
zlá	dobrá	MYXOREN inj. MYXOREN inj. + PESTORIN NEO inj. (oddelene na dve miesta) <b>alebo</b> PESTORIN MORMYX inj. (jeden vpich)	4. 10.
zlá	neznáma	MYXOREN inj. PESTORIN MORMYX inj. (jeden vpich) <b>alebo</b> MYXOREN inj. + PESTORIN NEO inj. (oddelene na dve miesta)	4. 10.
neznáma	neznáma	PESTORIN MORMYX inj. PESTORIN MORMYX inj.	6. 10.
dobrá	zlá	PESTORIN NEO inj. PESTORIN MORMYX inj. (jeden vpich) <b>alebo</b> MYXOREN inj. + PESTORIN NEO inj. (oddelene na dve miesta)	6. 10.
neznáma	zlá	PESTORIN NEO inj. + MORMYX inj. (oddelene na dve miesta) <b>alebo</b> PESTORIN MORMYX inj. (jeden vpich) PESTORIN NEO inj. MORMYX inj.	6. 10. 12.
zlá	zlá	MYXOREN inj. PESTORIN NEO inj. PESTORIN MORMYX inj. (jeden vpich) <b>alebo</b> MYXOREN inj. + PESTORIN NEO inj. (oddelene na dve miesta)	4. 6. 10.

MXT\* - myxomatóza

**U chovných zvierat** sa odporúča revakcinácia proti myxomatóze v 4 mesačných a proti moru v 12 mesačných intervaloch. Vzhľadom k sezónnosti výskytu myxomatózy, ktorá súvisí s výskytom komárov, je potrebné urobiť vakcináciu aj revakcináciu tak, aby v kritickom období výskytu nákazy boli zvieratá plne chránené, to je začať podľa možností s vakcináciou skoro na jar.

